

موقع الدواء في المدرسة

تتصح منظمة الحساسية والصدمة التحسسية في أستراليا (A&AA) المدارس والأهل العمل على تطبيق مجموعة من الاستراتيجيات للمساعدة في تقليل خطر ردة الفعل التحسسية ووضع ترتيبات لتسهيل الاستجابة الطارئة عندما يتعرض تلميذ لردة فعل تحسسية. تتوفر المعلومات عن الاستراتيجيات التي نشجع اتباعها، مجاناً على موقع www.allergyfacts.org.au. كما يمكنكم الاتصال على الرقم 1300 728 000 لمناقشة الحالة.

تشجع A&AA المدارس الحصول على أدوات طبية تحتوي على الحاقن الذاتي للأدرينالين/الإبينفرين وعلى خطة ASCIA للتصرف عند الصدمة التحسسية لكل طفل تم تشخيص حالته أنه في خطر الإصابة بصدمة تحسسية.

لا ينصح أن يُبقي الأطفال دون سن العاشرة الأدوات الطبية التي تحتوي على الحاقن الذاتي للأدرينالين/الإبينفرين معهم إلا إذا كان الطفل في طريقه إلى المدرسة بدون صحبة شخص راشد أو في حال نصح طبيبه المعالج بذلك. وتتضمن أسبابنا (ولكن ليست محصورة بـ):

- أن يلعب الأطفال بالحقن الذاتي للأدرينالين/الإبينفرين في الملعب (حتى الأطفال محط الثقة يقال أنهم أظهروا الأدرينالين/ الإبينفرين لأصدقائهم كما أنهم إما حقنوا أنفسهم أو حقنوا صديقهم به).
 - أن يلعب الأطفال بالحقن، ويجعله في حالة جهوزية، ثم يضعونه مع الأدوات الطبية دون إبلاغ أحد (وعند تفحص الدواء في وقت لاحق، وجد الأشخاص الراشدون أنه قد تم تفعيل الحاقن مما جعله غير صالح للاستعمال في حال الطوارئ).
 - أن يأخذ الأطفال حقيبة الأدوات الطبية، ويتركوها في مكان ما دون أن يبلغوا شخصاً راشداً (لأن خصرهم كان "حاراً" أو تمت إغاضتهم).
 - خطر احتمال زيادة القلق عند الطفل الذي يظن أن دواءه يجب أن يكون بالقرب منه (مثلاً يحملونه) في كل الأوقات حتى مع وجود راشدين في المدرسة يعون الموضوع جيداً.
 - خطر أن يتعرض الحاقن للكسر في نشاطات الملعب أو من جراء السقوط (هذه الأجهزة تحتوي على زجاج داخلي).
- لقد تم الإبلاغ عن كل ما ذكر أعلاه في أوقات متعددة.

الرجاء الاتصال بطبيب طفلك إذا شعرت أن الظروف في خطة تدبير التعامل مع الحساسية استثنائية.

عندما يصبح الأطفال في الصف الخامس أو السادس نشجع على أن يحمل الطفل دواءه معه وذلك ليكون جاهزاً للمرحلة المتوسطة حيث غالباً ما يذهب الأطفال بأنفسهم إلى المدرسة ويعودون منها دون صحبة الأهل، و ينتقلوا من صف إلى آخر وأحياناً تكون لديهم نشاطات خارج حرم المدرسة.

الا في حالات استثنائية، يجب أن يوضع الحاقن للأطفال دون سن الـ ١٠ في مكان مركزي في المدرسة غير مقفل ويسهل الوصول إليه. يجب أن يكون في كل مدرسة نظام بحيث يمكن الوصول إلى الدواء بسرعة عندما تظهر على الطفل علامات أو أعراض ردة فعل تحسسية. للمزيد من المعلومات أو الاقتراحات على الخطوات أو الترتيبات في المدرسة الابتدائية، الرجاء الاتصال على **1300 728 000**.

الرجاء أيضاً مراجعة الأسئلة المتكررة لـ ASCIA (جمعية أستراليا لعلم المناعة السريري والحساسية) حول الحاقن الذاتي للأدرينالين/الإبينفرين والأسئلة المتكررة حول خطة ASCIA للتصرف.

ABN: 70 693 242 620

www.allergyfacts.org.au

A&AA© 2016